

Evaluación	Recién nacido	1 a 6 meses	7 a 12 meses	1 año y medio	Dos años	Tres años	Cuatro años	Cinco años	Seis años	Siete años	Ocho años	Nueve años	Diez años	De diez a trece años	De diez a dieciocho años	Observaciones
Cariotipo	x															Una vez. También aplica si hubo cordocentesis o amniocentesis. Confirmar diagnóstico y tipo de trisomía.
Consultoría genética	x															Asesoría de condición genética.
TSH al nacer	X															Detectar hipotiroidismo
Cuadro Hemático completo y Frotis de sangre periférica.	X			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	Por riesgo aumentado de desorden mieloproliferativo.
TSH y T4 libre.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	A los 3 meses y luego anual indefinidamente. Por riesgo aumentado de hipotiroidismo.
Valoración y seguimiento por endocrinología																En caso de TSH y T4 Libre alterados.
Ecocardiograma	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Recién nacido, 6 meses, un año, y luego anualmente por riesgo aumentado por riesgo aumentado de hipertensión pulmonar (HTP) en cualquier momento de la vida.
Potenciales evocados auditivos con umbral en la onda V en todas las frecuencias.			x													Seis meses, un año, y luego anualmente hasta los cuatro años, por riesgo aumentado de demora en la maduración en la vía auditiva y/o hipoacusia conductiva o hipoacusia neuro sensorial.
Audiometría o test auditivo comportamental e Impedanciometría																A partir de los 4 años cuando el niño ya colabora. De ahí para adelante una vez al año hasta los 18 años.
Control con otorrinolaringología				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Para seguimiento de posibles alteraciones en oído, nariz y garganta. Mayor riesgo de hipoacusia conductiva y alteraciones por conductos estrechos.

